

概要まとめ

スイートコーン

昨年よりも味は印象深いものにするほか、倒伏対策を入れ、収量を上げたい【現在 6 割】

見積は 2 パターン タキポリンの物 夢ぼかし の 2 パターン作成。

相談時の肥料まとめ

堆肥すきこみ時

GBS カニガラ粉末 を土づくりとして使用 病気の減少を狙う

GBS 【反 5 から 10】 カニガラ粉末は未定⇒確認中

4 月上旬ごろ【元肥】

ゆめぼかし【反 12】 マグホス【反 3】 倒伏対策と生育揃え生育揃え

スーパーポーラス【反 3】

医王石 全層での利用で、PH の標準化とケイ酸を使用して茎を硬く強固にする目的を含む

追肥 40 cm から 50 cm 頃

メインマグ F セルエナジー

窒素でなく、ミネラルの補給の施用 イメージ発根を促すのと、
マルチの上からの施用でも効果を出したいなどの理由から

7 葉期 ゆうずいが出だした時

追肥 敷島 6 号を使用

全て本数未決定

※コンテストは例年秋の物を植えていた今年は夏の物を提出

結果は 2 月頃反映

賞を取るよりも、味や販売の方を重視。

※今年の課題は日照不足の部分の考えあり

水稻

最大のボトルネックは、今年のヒノヒカリ圃場区。ここの特性に合わせた対策をとっていくことで効果が大きく変わる。

栽培の様子から、品種を変更することをおすすめするが、
現状の品種を変更することが困難なことから一番おススメなのは
あきろまん

対策として ひのひかりの時点での話↓

一か月目セルエナジー分欠本数 収量を取りに行く狙い、
コーティングを側条施肥で入れた方がいい 17-15-15 を 50kg⇒現状で良い
約出穂 20 日前に追肥 ⇒窒素 1.5～1.8 ぐらい
穂が出た後にボンバルディア。つぶはりを確保
紋枯れの葉をモンガリット粒剤

セルエナジーは 200 ml流し込み

ボンバルディア 1ℓ

コシヒカリでも、似たようなことは起こる。

あきろまんもしている。コシよりあきろまんにしたほうが。追肥 トモエ 333 反 1
セルエナジー 【1 か月後】 ボンバルディアが 【穂が出た後】 1 町 5 反。

3 施に 100kg のエフグリーン入れて見てください⇒激変します。