

ぶろっこリー対策

8月初旬定植 三月の防除なら、土づくりによるが20日ぐらいのローテーションでも可能かもしれません

※ 定植時にバイオアミド100倍をドブ漬け

時 期	気門封鎖	殺菌剤	殺菌剤	放線菌資材	展着剤
8月中旬	サンクリスタル乳剤	ジーファイン水和剤		バイオアミド	ブレイクスルー
8月下旬	サンクリスタル乳剤	ジーファイン水和剤	マスタピース水和剤	バイオアミド	ブレイクスルー
9月上旬	サンクリスタル乳剤	ジーファイン水和剤		バイオアミド	ブレイクスルー
9月中旬	サンクリスタル乳剤	ジーファイン水和剤		バイオアミド	ブレイクスルー
9月下旬	サンクリスタル乳剤	ジーファイン水和剤	マスタピース水和剤	バイオアミド	ブレイクスルー
2月中旬					
3月上旬					
3月中旬					
	サンクリスタル乳剤・ジーファイン水和剤・マスタピース水和剤・マスタピース水和剤はJAS登録農薬ですので回数に制限はありません。				

虫に関しては、
グレーシア
スピノエースを使用で

ストロビン系は現在
4回で回数オーバー
なので減らしたい

※ サンクリスタル乳剤は1,000倍で使用。バイオアミドは300倍で使用。ブレイクスルーは10,000倍で使用。

ブレイクスルーはシリコン系の機能性展着剤であるので倍率には注意が必要

☆ 雨の多い時期や害虫の多い時期はマスタピース水和剤を入れる。効果は1週刊程度。傷口への絆創膏効果

10月12日 12ハズ

黒腐れ

害虫対策と雨の後の対策が必要、比較的高温時に活発に活動する細菌が原因。

病害の発生時期よりも事前の予防が必要、頻発圃場には降雨後の対策が効果を上げる。

※ 菌体入り土壌改良材等での土壌改良+微量要素で土壌環境の整備が基本。

※ 溝堀・高畝等の基本対策で大きく効果があると考えられる。