

12ポリ缶入

低温時にも
効きめが見える

植物活性剤

サンマリン

100%海藻抽出エキス

だから安全・経済的！
農薬も減らせます♡



サンマリンは極寒の南氷洋で育つ褐藻類(こんぶ、あらめ、かじめ等の仲間)から抽出生成した活性度の高い濃縮エキスです。

原料となる海藻は、厳しい環境ストレスに対応するために、陸上の植物では見られない代謝系を備えており、海藻多糖類・植物活性ホルモンなど特殊な物質を蓄えています。


冷害や早魃に悩まされることが多い、北欧・地中海諸国、オーストラリア、米国などでも、広く使用されています。

輸入
販売

ファームランドトレーディング株式会社



東京都港区新橋6丁目16番8号レックスビル
〒105-0001 電話(03)3431-4129番(代)
FAX(03)3432-6356



サンマリンは極寒の南氷洋で育つ褐藻類(こんぶ、あらめ、かじめ等の仲間)から抽出生成した活性度の高い濃縮エキスです。

成 分

- 植物活性物質：サイトカイニン、オーキシン、ジベレリン、アブシジン酸ほか数種類。
- 海藻多糖類：アルギン酸、ラミナリン、フコイシン、褐藻タンニン群など。
- 遊離アミノ酸：アスパラギン酸、アルギニン、メチオニン、リジンなど、20種類以上。
- ミネラル類：苦土、鉄、マンガン、ホーソや、セレンなどの希少元素まで60種類以上。

効 果

- 低温・日照不足・過湿・乾燥など、ストレスの高い環境下での抵抗力を強化。
- 細胞分裂促進・葉緑素増加・光合成機能の向上と、根群の生育促進。
- 花芽分化・開花・受粉メカニズムの活性化と収量・食味・色つや・日持ちの向上効果。

施用方法

- 種子浸漬：500倍液。
- 葉面散布・灌水・灌注：500～1,000倍液。一作・10㎡当り1～2ℓを目安としてください。
- 根菜：芽だし直後、肥大直前の葉面散布・土壌灌注・灌水は、特に効果的です。
- 果菜：育苗期、定植後、第一花(果房)開花前、収穫最盛期(3～4週間毎)。
- 葉菜：育苗期、定植後、結球開始前。
- 茶樹：萌芽前(霜害予防)、一番茶収穫後。
- 花卉：育苗期、定植後、発蕾前、発蕾後。
- 葉タバコ：育苗期、定植後一か月毎。
- 果樹：開花前、開花後、果実肥大初期～中期。
- 水稻：育苗期、分けつ開始期、幼穂形成期、穂ばらみ期(流し込みの場合は50倍液を流し、3～4日の間、保ってください)。
- 芝生：芽だし直前、休眠前、高温期・低温期の高ストレス時。
- 農薬・液肥との混用は可能です。但し、アルカリ性の強い薬剤との混用は避けてください。

〈注意事項〉

- 過剰施用は、生育を抑制する場合がありますので御注意ください。
- 幼児の手の届かぬ冷暗所に、密閉して保管してください。