

**強力**

# スペースエージ

植物が満足する総合栄養材

3-4-3

**微量  
要素**

ほう酸・鉄・亜鉛  
銅・モリブデン

**クロレラ  
抽出物**

核酸関連物質  
糖タンパク・多糖体  
アミノ酸・ビタミン

**酵母  
エキス**

アミノ酸・ビタミン

**トレハ  
ロース**

糖 質

**もろみ  
エキス**

有機酸・アミノ酸

**特長** 強力スペースエージの主成分が植物を刺激し、植物のバランスを整えます。



その他  
特長

- 食味・糖度向上
- 果実肥大
- 成り疲れ防止
- たな持ち向上

定植後の活着促進、樹勢保持、糖度不足の場合は10a当り500g(400ml)を灌水处理してください。

葉面散布の場合は1,000倍(水量100Lに80ml)でご使用ください。

農薬との混合使用が効果的です。

### 使用 方 法 (使用量《希釈倍数・量・処理間隔・回数》は樹勢をみて加減してください)

|                       | 施用方法(灌水10a当たり)               | 散布回数目安                         |        |     |      |      |    |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|-----|------|------|----|
|                       |                              | 果菜類                            | 葉菜類    | 根菜類 | 花卉類  | 果樹類  | 茶木 |
| 育 苗 期                 | 1,500~2,000倍: 葉面散布・灌水        | 10日毎                           | 10日毎   |     | 10日毎 |      |    |
| 定 植 期                 | 1,000倍: 定植前・どぶ漬け<br>定植後・灌水   | 各1回                            | 各1回    |     | 各1回  |      |    |
| 生 育 期                 | 1,000倍: 葉面散布                 | 10日毎                           | 初期10日毎 | 2回  | 10日毎 |      |    |
|                       | 500g: 灌水                     |                                | 初期1~2回 |     | 1~2回 |      | 1回 |
| 開 花 期                 | 1,000倍: 葉面散布                 |                                |        |     |      | 3回   |    |
| 肥大期・結球期               | 1,000倍: 葉面散布                 |                                |        |     |      |      |    |
|                       | 500g: 灌水                     |                                | 初期1回   |     |      |      |    |
| 収 穫 期                 | 500g: 灌水                     |                                |        |     |      |      |    |
| 収 穫 後                 | 1,000倍: 葉面散布                 |                                |        |     |      | 2~3回 | 2回 |
| 萌 芽 期                 | 500g: 灌水(2,000倍)             |                                |        |     |      | 2回   | 2回 |
| 生育不良・成り疲れ時<br>曇天時・大雨後 | 500~1,000倍: 葉面散布<br>500g: 灌水 | 2~3回を2~3日毎に葉面散布<br>2~3回を5日毎に灌水 |        |     |      |      |    |

#### 使用上の注意

- 直射日光を避け冷暗所に保存してください。又厳寒期は凍らない場所で保存してください。
- 本剤の希釈液は保存がきかないので、その都度、必要量だけを希釈して、使用してください。
- 農薬(殺菌剤、殺虫剤)との混合使用をする場合は、あらかじめ農薬を所定量の濃度に希釈した後で、必要量の強力スペースエージを加えてください。但し、強アルカリ性の農薬は避けてください。

#### 取り扱い販売店