

業界初成分※1配合!!


バイオスティミュラント

LEAFENERGY

[リーフエナジー]

LEAFENERGYは植物に若々しさと活力を与え 安定した生育、品質、収穫をサポートします

POINT



業界初成分※1

業界初となる希少脂肪酸を成分とするバイオスティミュラント※2です。



安全性の高い資材

天然由来のため、植物・人・地球環境に対して安全性の高い資材です。



植物のストレスを緩和

高温、干ばつ等の様々な外的要因によるストレスを緩和し、健全な成育をサポートします。



※1 特許(第6759448)取得成分

※2 バイオスティミュラントは環境など外部ストレスを緩和する栽培補助資材です



水稻

処理区

無処理区

散布2週間後の状況

天候不順によるストレス



いちご

なり疲れを緩和



ゴルフ場ベントグリーン

処理区

無処理区

サマーストレスを緩和

バイオスティミュラント

希少脂肪酸のチカラ

LEAFENERGY

水稲向け

・【育苗期】葉面散布 施用方法 育苗中の最終散水・灌水時もしくは、田植え後3週間以内に施用下さい

活性化剤種	苗箱20枚あたり 製品使用量	希釈倍率	散布方法	散布タイミング	散布頻度
液剤	500mℓ	10～40倍	ジョウロ等	育苗最終	1回

果菜類向け(キュウリ・いちご・ナス・ピーマンなど)

・【定植前・育苗期】葉面散布 施用方法 定植前の最終散水・灌水時に施用下さい

活性化剤種	苗1000本あたり 製品使用量	希釈倍率	散布方法	散布タイミング	散布頻度
液剤	500mℓ	10～40倍	ジョウロ等	定植前	1回

・【本圃】葉面散布 施用方法 殺虫剤・殺菌剤の散布に合わせ、2週間に一度程度葉面散布ください

活性化剤種	10aあたり 製品使用量	希釈倍率	散布方法	散布タイミング	散布頻度
液剤	500mℓ	300～1000倍	葉面散布	全期間 特に定植以降	2週間に1度程度

・【本圃】灌注 施用方法 2週間に一度程度灌注施用ください ※農薬や肥料と混用可能です

活性化剤種	10aあたり 製品使用量	散布方法	散布タイミング	散布頻度
液剤	500mℓ	混入機	全期間 特に定植以降	2週間に1度程度

その他(ブロッコリー・キャベツ)

・【定植前・育苗期】葉面散布 施用方法 定植前の最終散水・灌水時に施用下さい

活性化剤種	セルトレー(128穴)あたりの 製品使用量	希釈倍率	散布方法	散布タイミング	散布頻度
液剤	15mℓ	30～60倍	ジョウロ等	定植前	1回

商品規格



液体タイプ500mℓ
紙製パック

使用方法

1反(10a)に本品1本を目安とし、水などで希釈後よくかき混ぜて、ジョウロ、噴霧器などを用いて散布して下さい。

植物の健全な育成をサポート



イビデン株式会社
技術開発本部

〒503-8503 岐阜県大垣市青柳町300
★リーフエナジーお問合せセンター TEL:0120-418-887
URL:<https://leafenergy.jp>

