

ブドウ栽培

月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
旬	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下

地上部の生長と生理

▶ブドウの適正土壌
pH：6.0～6.5 土性：砂壤土

▶土壌改良材
完熟堆肥、タキアーゼ・Sの他に下記の資材を施用する。

土質	pH	6.5以下	6.5以上
砂質土		ヒューライム ネガアツプ	カルミタス ネガアツプ
粘質土		ヒューライム テルアソ	カルミタス ピートモス

枝の伸長 (cm)

200
150
100
50

萌芽

枝・葉の生長
元肥・芽肥
枝・葉の生長
元肥・芽肥
枝・葉の生長
元肥・芽肥

養分転換期

休眠期

枝葉生長期

肥料の効かせ方

元肥

葉面散布1
アクセル1号

ポイント！
休眠打破

芽出肥

葉面散布2
アクセル2号
タイミンダ2号

根の発生

作業

元土棚の改良
肥料の改良
整枝
排水
凍害対策
かん水
春草除草

枝の結束
芽出肥施用

芽霜害対策
誘引房

品 種		施肥期	元 肥	芽 出 肥	玉 肥 1	果
		肥料名	しき島(九重)6号	マグホス	しき島(九重)6号	
		地域 / 時期	12月	萌 芽 期	開花後10～15日	
テラウエア		寒 地	100	60	20	20
テラウエア		暖 地	80	60	20	20
巨 峰 群		全 国	60	60	20	20
ピオーネ等(GA処理群)		全 国	—	60	20×2回 多木有機液肥3号、開花前	20×2
ベリーA、ネオマス、キャザル		全 国	80～100	60	40	20～4

kg

10a

(注) 地域により開花・収穫・施肥時期・施肥量が異なりますので適宜加減してください。有機液肥の希釈は条件によって異なりますが

