

バイオスティミュラント

LEAFENERGY®




使用方法


果菜類

施用時期、施用倍率


◎イチゴ



◎トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなど



◎メロン・スイカ・カボチャなど



葉菜類 | 施用時期、施用倍率

◎ レタス・ブロッコリー・白菜・長ネギなど

栽培スケジュール		播種		定植		収穫	
----------	--	----	--	----	--	----	--

定植1-5日前
250ml/10a
300~500倍程度
農薬混用or灌水

◎ ほうれん草・小松菜・チンゲン菜など

栽培スケジュール		播種		間引		収穫	
----------	--	----	--	----	--	----	--

最終間引き後
250ml/10a
1,000倍程度
農薬混用or灌水

◎ ニラ・万能ネギ・アスパラガスなど


栽培スケジュール		定植		収穫	収穫	収穫	収穫	収穫	収穫	収穫
----------	--	----	--	----	----	----	----	----	----	----

定植1-5日前
250ml/10a
300~500倍程度
農薬混用or灌水


収穫後
250ml/10a
1,000倍程度
農薬混用or灌水

穀物 | 施用時期、施用倍率


◎ 水稲




◎ 麦



◎ 大豆・枝豆など



◎ トウモロコシ



根茎菜類 | 施用時期、施用倍率

◎ 甘藷

生育ステージ	定植		根茎形成期	根茎肥大期	収穫
--------	----	--	-------	-------	----

苗消毒時
250ml/10a
1,000倍程度
農薬混用or灌水

◎ 馬鈴薯・里芋など

生育ステージ	定植	栄養成長期	塊茎形成期	塊茎肥大期	収穫
--------	----	-------	-------	-------	----

開花期
250ml/10a
1,000倍程度
農薬混用or灌水

◎ 人参・大根・甜菜など

生育ステージ	播種		根茎形成期	根茎肥大期	収穫
--------	----	--	-------	-------	----

4~6葉期
250ml/10a
1,000倍程度
農薬混用or灌水

肥大中~終期
250ml/10a
1,000倍程度
農薬混用or灌水

◎ 玉ねぎ・ニンニクなど


栽培ステージ	播種	定植	茎葉伸長期	球肥大期	収穫
--------	----	----	-------	------	----

定植1-5日前
250ml/10a
300~500倍程度
農薬混用or灌水


肥大中~終期
250ml/10a
1,000倍程度
農薬混用or灌水

花卉 | 施用時期、施用倍率

◎ キク、カーネーション



◎ バラ



果樹 | 施用時期、施用倍率

