

殺虫剤	使用時期	使用回数	備考
ハーベストオイル	12.3月/3.6月	-	イオウフロアブル、石灰硫黄合剤、ボルドー液の混用は避ける。デランフロアブルとマシン油を混用する場合は開花期以前とする。
アブロード水和剤	45日前	3	
オリオン水和剤40	14日前	3	
スミローディ乳剤	14日前	3	
エクシレルSC	前日	3	石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用は避ける。
ダントツ水溶剤	前日	3	かんきつに樹幹散布で使用する場合は、散布液が葉にかかると薬害を生じるおそれがあるので、葉にかからないように十分注意する。
コルト顆粒水和剤	前日	3	石灰硫黄合剤との混用は避ける。
サンマイト水和剤	3日前	2	イオウフロアブル、石灰硫黄合剤との混用は避ける。
トランスフォームフロアブル	前日	3	
エルサン乳剤	14日前	2	石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤との混用はさける。
コテツフロアブル	前日	2	ボルドー液と混用する場合は凝集することがあるので注意する。
アブロードエースフロアブル	45日前	2	
ダニゲッターフロアブル	前日	1	ボルドー液との同時散布および前後14日以内の近接散布は効果が劣るおそれがありますのでさけて下さい。
ダニトロンフロアブル	前日	2	石灰硫黄合剤との混用はさける。
カネマイトフロアブル	7日前	1	ボルドー液などのアルカリ性の強い薬剤との混用はさける。
コロマイトフロアブル	7日前	2	高温、乾燥時の散布は薬害のおそれがあるのでさけること。
アクセルフロアブル	7日前	3	
ハチハチフロアブル	前日	2	
ファインセーブフロアブル	7日前	2	
スピノエースフロアブル	7日前	2	
アグリメック	7日前	3	
フェニックスフロアブル	前日	2	

※農薬を使用する際には、必ず農薬のラベルを確認してご使用ください。

殺菌剤	使用時期	使用回数	備考
ムッシュボルドーDF	-	-	
ICボルドー66D	発芽前	-	ダニコングフロアブル、ダブルフェースフロアブルとの混用は避ける。
アビオンE	-	-	
デランフロアブル	30日前	3	デランフロアブルとマシン油を混用する場合は開花期以前とする。
オキシンドー水和剤80	30/60日前	3	石灰硫黄合剤、水和硫黄剤との混用は薬害のおそれがあるのでさける。
ゲッター水和剤	開花期/21日前	5	石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけてください。
スイッチ顆粒水和剤	45日前	2	
クレフノン	-	-	
園芸ボルドー	-	-	マシン油乳剤との混用はさけてください。かんきつに使用する際は、薬害軽減のため炭酸カルシウム水和剤を加用してください。
クプロシールド	-	-	石灰硫黄合剤等アルカリ性薬剤との混用はさける。発芽期以降は炭酸カルシウム水和剤を加用することが望ましい。
ジマンダイセン水和剤	90日前	4	石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけてください。ボルドー液との7日以内の近接散布は薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
パレード15フロアブル	7日前	2	
ファンタジスタ顆粒水和剤	14日前	3	
マイコシールド	30日前	2	石灰硫黄合剤との混用はさけてください。
ストロビードライフロアブル	14日前	3	ボルドー液との混用はさけてください。
ナティーボフロアブル	前日	3	
ナリアWDG	14日前	3	
トップジンM水和剤	前日	5	ボルドー液との混用はさけてください。
ベンレート水和剤	前日	2	
ベルコートフロアブル	前日	2	

※農薬を使用する際には、必ず農薬のラベルを確認してご使用ください。