

この薬を使用している方のための情報です。

製品名

グランダキシ錠50

持田製薬株式会社

薬には効果(ベネフィット)だけでなく副作用(リスク)があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

内服剤

2019年07月改訂

主成分 トフィソパム (Tofisopam)

剤形 微黄白色の錠剤、直径8.0mm、厚み3.2mm

シート記載など グランダキシ錠50mg、MO110、GRANDAXIN Tab.50mg



この薬の作用と効果について

中枢の視床下部に作用して、自律神経系のアンバランスを改善する薬です。

通常、自律神経失調症や、頭部・頸部損傷、更年期障害・卵巣欠落症状における頭痛・頭重、倦怠感、動悸、発汗などの自律神経症状の治療に用いられます。

次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- 以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。急性閉塞隅角緑内障、重症筋無力症、呼吸不全、脳に器質的障害がある。
- 妊娠または授乳中
- 他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- **あなたの用法・用量は**(医療担当者記入)
- 通常、成人は1回1錠（主成分として50mg）を、1日3回服用しますが、年齢・症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- 飲み忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分を飲んでください。ただし、次の服用時間が近い場合は忘れた分は飲まないで、次の服用時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

- アルコールによってこの薬の作用が強まるおそれがありますので、飲酒は控えるようにしてください。
- 眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下が起こることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作はしないようにしてください。



⚠ この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、眠気、ふらつき、口渇、吐き気・嘔吐、食欲不振、便秘、腹痛、倦怠感・脱力感、発疹、かゆみ、発熱、顔面浮腫などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、**[]**内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- 該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。



📦 保管方法その他

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- 薬が残った場合は、保管しないで廃棄してください。



📅 医療担当者記入欄

年 月 日



より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。

医療関係者向け添付文書

（財）日本医薬情報センター（JAPIC）のデータベース「iyakuSearch」にリンクしています。専門的な情報が含まれていますので、疑問などを持たれた場合には、自分で判断せず、医師または薬剤師に必ずご相談ください。